

VADEMECUM DE GARRAPATICIDAS



◀ **IVERMIC PREMIUM**
Ivermectina 3.15%
1 ml cada 50 kg



◀ **DORAMIC PREMIUM**
Doramectina 3.15%
1 ml cada 50 kg



◀ **FIPROSULES**
Fipronil 1%
1ml cada 10 Kg



◀ **CICLOTICK**
Fluazuron 2.5%
1ml cada 10 Kg



◀ **ECTOSULES**
Cipermetrina 15%
Baño



◀ **ACARMIC**
Amitraz 12.5%
Baño

Para cada **Generación de Garrapatas** (G1, G2, G3) se debe de utilizar un garrapaticida con un **modo de acción diferente**.

TRATAMIENTO GENERACIONAL

(Basado en Cuore, et al. 2008)



CONSIDERACIONES IMPORTANTES

- Respetar fechas de tratamientos y revisiones estipuladas
- Utilización exclusiva de los garrapaticidas propuestos de acuerdo a las instrucciones del fabricante
- Junta y tratar todo el rodeo
- Cuidar los alambrados perimetrales y animales sueltos
- Movimiento de animales (Ingreso, extracción envío a faena.
- Respetar los tiempos de espera antes de enviar animales a faena.



PROGRAMA PARA EL CONTROL / ERRADICACIÓN DE LA GARRAPATA COMÚN DEL GANADO




Propietario y Fabricante
LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S.A.
 Ruta 101 km.28, Con. al Paso Escobar s/n
 Pueblo Capitán Artigas Canelones - Uruguay
 Tel.: (5982) 2886761* Fax: (5982) 2886760
 Responsable Técnico: Dr. Pablo R. Bringas





CICLO EVOLUTIVO DE LA GARRAPATA COMÚN DEL GANADO



DURACIÓN DEL CICLO PARASITARIO
Modo: 23 días

FACTORES QUE AFECTAN
 Razas bovinas
 Manejo

NO TODOS LOS GARRAPATICIDAS ACTUAN DE IGUAL MANERA.

- CONTACTO** (en general los baños)
- INTERMEDIOS** (Fipronil)
- SISTÉMICOS** (Lactonas y Fluazuron)



Programa recomendado por la DGSG-MGAP a través del cual se tratan los bovinos, rotando garrapaticidas eficaces, con diferente modo de acción. Se puede volver al mismo garrapaticida en un plazo no menor a los 8-10 meses.

MODELO DE DESARROLLO DE LAS GARRAPATAS EN URUGUAY (Nari et al 1985)



La temporada de garrapatas en Uruguay tiene tres generaciones, con un pico de **parásitos en otoño**. El frío invernal disminuye drásticamente la producción de huevos y la contaminación de las pasturas.

CICLO NO PARASITARIO (REFUGIO)



CONSIDERAR LA DURACIÓN DEL CICLO **NO PARASITARIO** ES LO MÁS IMPORTANTE

- Factores que Influyen:**
- Clima
 - Tipo de Suelo
 - Pasturas
 - Abrigo

Las garrapatas sobrevivientes a cualquier tratamiento no pueden sobrevivir mas de 8-10 meses, por lo que **nunca serán presionadas con la misma droga**.



PARA TENER EN CUENTA ANTES DE COMENZAR EL CONTROL

- 1- ANTECEDENTES DE TRATAMIENTOS.
- 2- ALAMBRADOS PERIMETRALES.
- 3- DIAGNÓSTICO DE SENSIBILIDAD

CICLOTICK ES UN GARRAPATICIDA DIFERENTE



CICLOTICK FORMA DE ACCIÓN

El **Ciclotick** (Fluazuron 2.5%) es un Inhibidor del crecimiento que actúa sobre las mudas de garrapatas y huevos, **inhibiendo la producción de quitina**. Sin quitina, las garrapatas quedan desprotegidas y mueren.

MAXIMA EFICACIA!!!